

猴痘疫情調查及接觸者追蹤指引

112.03.08 版

一、 疫情調查

(一) 完成時限

疑似個案經通報至「傳染病通報系統」且判定為確定病例時，由個案居住地所在之縣市政府衛生局依「猴痘疫調單」於個案確診後 24 小時內完成疫調作業。

(二) 疫調作業

請依「猴痘疫調單」(如附件)進行疫調，完成疫調單中包括個案基本資料、臨床狀況、發病前 21 天至就醫隔離前的活動地點、旅遊史、接觸史、就醫史等資訊蒐集，疫調時應同時完成通報個案之接觸者名單建立。疫調人員應採取之感染管制防護措施請參考感染管制指引個人防護裝備建議。

(三) 接觸定義

自個案發病後至病患所有皮疹均結痂時，曾直接接觸感染者呼吸道分泌物、皮膚或黏膜，或在無適當防護下提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液者。

(四) 接觸者匡列處置原則

符合前述接觸定義之個案接觸對象皆應列為接觸者，並依接觸風險等級採行適當處置。接觸風險等級高者，可給予暴露後預防接種，處置原則將視疫情與疫苗供應現況更新。

接觸風險等級	情境描述	情境舉例	處置
高	無適當防護之長時間持續密切接觸，包括： <ul style="list-style-type: none">● 皮膚黏膜與確診病患皮膚黏膜接觸。● 皮膚黏膜與確診病患之分泌物或痂皮接觸。● 皮膚黏膜與被確診病患之分泌物或皮膚病灶、痂皮汙染之物品(如衣物或床單)接觸。● 吸入確診病患飛沫微粒(aerosol)或乾燥分泌物之揚塵。	<ul style="list-style-type: none">● 同住家人。● 曾有任何形式性接觸之性伴侶。● 於病患執行會產生飛沫微粒(aerosol)之醫療措施時，未穿戴 N95 面罩與護目鏡/面罩，且位於同一房間或相距 2 公尺內之醫療相關人員。● 清掃被汙染的房間時無適當防護，可能吸入飛沫或揚塵者。● 實驗室操作過程中曾於無適當防護狀況下暴露於具活性的猴痘	<ul style="list-style-type: none">● 針對高風險密切接觸者開立健康監測通知書，主動追蹤其健康狀況至最後一次與病例接觸後 21 天，並每日至「接觸者健康管理系統」進行回報。● 評估後給予暴露後預防接種，請儘早於暴露後 4 天內接種，以達最佳預防效果，若未出現猴痘相關症狀，可於最後一次暴露後 14 天內接種。● 衛教接觸者若無症狀可正常工作生活，但建議避免近距離接觸免疫低下者、孕婦與孩童，以及在健康

		病毒，或可能含有病毒之檢體者。	<p>監測期間避免性行為、捐血。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如於追蹤期間出現發燒或出疹，應協助其就醫。
中	<p>不符合上述高風險接觸定義，但符合下列任一者：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 曾提供確診病患醫療照護，且未佩戴符合接觸情境之防護裝備。 ● 交通工具左右鄰座者。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 曾與病患共處同一空間(相距2公尺內)，累計超過三小時，且未佩戴外科口罩以上等級防護裝備之醫療相關人員。 ● 醫療相關人員之衣物與病患皮疹、體液或受污染之床單或敷料曾有接觸，且未穿著隔離衣者。 ● 飛機左右鄰座者。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 衛教接觸者應自我健康監測至最後一次與病例接觸後21天。 ● 若無症狀可正常工作生活，但建議避免近距離接觸免疫低下者、孕婦與孩童，以及在健康監測期間避免性行為、捐血。 ● 如於追蹤期間出現發燒或出疹，應協助其就醫。
低	<p>不符合上述高、中風險情境，但符合下列任一者：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 社區一般接觸，或戶外接觸。 ● 接觸時有持續佩戴符合接觸情境之防護裝備。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 短暫交談互動。 ● 曾與確診病患共處同一空間，但無前述高、中等級接觸者。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 衛教猴痘相關症狀及傳播方式。

註：

1. 遇特殊情境時，可請疾病管制署各區管制中心協助判斷匡列。
2. 須匡列之接觸者仍應視實際疫調情形作適當調整，另於特殊情況下，可依據現場疫調及風險評估結果，採取較嚴格標準，擴大接觸者匡列範圍，及採行必要之防治措施。
3. 高風險接觸者健康狀況追蹤、暴露後預防接種與中風險接觸者自我健康監測細節另參閱相關指引。
4. 與確診個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者，包括確診個案於發病前潛伏期期間之性接觸者；以及發病後之性接觸者，若未及於最後一次暴露後14天內接種PEP疫苗，可於追蹤監測期滿後，安排接種PrEP疫苗。
5. 請提醒接觸者如有出現發燒或出疹等疑似猴痘症狀，應主動聯繫衛生單位，由衛生單位協助安排至感染科就醫，就醫時應佩戴醫用口罩。