

正本

檔 號：

保存年限：

中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：10688台北市大安區安和路一段29號9樓

承辦人：曾欣怡

電話：(02)2752-7286#122

傳真：(02)2771-8392

電子信箱：cynthia@tma.tw

受文者：各縣市醫師公會

發文日期：中華民國99年6月25日

發文字號：全醫聯字第0990001324號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通


附件：如說明

主旨：轉知行政院衛生署疾病管制局鑑於近期國內已連續發現數起本土成人麻疹病例，請 貴會協助提醒所屬會員醫師提高警覺，以利麻疹及早診斷通報，及時採取隔離及防治措施，避免疫情擴大，請 查照。

說明：

- 一、依據行政院衛生署疾病管制局99年6月23日衛署疾管防字第0990013118號函辦理，隨函附寄該函影本乙份。
- 二、本函刊登台灣醫界雜誌及本會網站。

正本：各縣市醫師公會
副本：



理事長

李明濱

上網公告
鄭華吟
PP. 6. 28

收文編號	收文日期	歸檔編號
1662	99.6.23 17:00	

檔 號：

保存年限：

行政院衛生署疾病管制局 函

機關地址：10050台北市中正區林森南路6號

承辦人：陳素幸

電話：23959825#3781

傳真：23945308

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國99年6月23日

發文字號：衛署疾管防字第0990013118號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：麻疹相關衛教資料 (0013118A00_ATTCH1.pdf)

主旨：鑑於近期國內已連續發現數起本土成人麻疹病例，請協助提醒所屬會員醫師提高警覺，以利麻疹及早診斷通報，及時採取隔離及防治措施，避免疫情擴大，請查照。

說明：

- 一、近年來國際間麻疹疫情頻傳，國內亦陸續有境外移入及本土個案發生，臨床醫師如發現病人具有發燒、出疹、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，問診時請特別注意病人是否曾與疑似麻疹病例之接觸史、有無完成麻疹相關疫苗接種及國外旅遊史，如懷疑為麻疹個案，應儘速通報送檢，並加強落實相關感控防護措施及病患之衛教，以降低疾病傳播之機會。
- 二、有關麻疹臨床症狀照片與鑑別診斷等資訊如附件，或可至本局全球資訊網 (www.cdc.gov.tw) 之「防疫專區--疾病介紹--第二類傳染病--麻疹」查詢下載。為加強疑似個案之診斷及通報，請協助透過會訊、活動通知、教育訓練、研討會、網站等管道，周知所屬會員醫師與醫療院所，做為臨床診斷參考。

播 號：

保存年限：

正本：中華民國醫師公會全國聯合會、臺灣兒科醫學會、臺灣感染症醫學會、臺灣內科醫學會、臺灣婦產科醫學會、臺灣皮膚科醫學會、臺灣耳鼻喉科醫學會、臺灣家庭醫學醫學會、台灣急診醫學會、臺灣醫院感染管制學會

副本：直轄市及各縣市衛生局、本局各分局(不含第七分局)

06/23/05
10:24:40

不
同
章







圖

裝

訂

線

醫師臨床鑑別診斷

<p>典型 症狀</p>			
<p>不典型 症狀</p>			

皮 疹

科 氏 斑

結 膜 炎

※一般是由臉頰開始出現紅斑丘疹，由上而下蔓延到頸、上肢、軀幹和下肢，皮疹大多不癢，皮疹有逐漸融合的趨勢，在第三天依出現先後次序開始消退。消退後會留下棕色的色素沉著，維持一段時間，也可能出現脫皮現象。

※部分個案的紅疹型態並不典型，疹子數目不多，也無明顯融合現象。若遇類似臨床表徵之病人，請以麻疹疑似個案處理，採取隔離措施，並立即通報。

麻疹與天花之比較

	麻疹	天花
流行病學	疫苗普及前，全球每年有1億人感染，600萬人死亡。2006年全球約1700萬人感染，24萬人死亡。	1970年以前，全球每年感染人數>1500萬人，>200萬人死亡。於1980年全球根除。
可傳染期	●發疹之前、後各4天內	●發燒後第3~6天最具傳染力 ●結疤完全脫落後方無傳染力
傳播途徑	●經空氣、飛沫、或病人人口鼻分泌物、或咽喉分泌物接觸傳染	●經空氣傳播，或與天花病人直接接觸
傳播力	●最具傳染力的疾病之一 ●1傳12-18人	●最具傳染力的疾病之一 ●1傳5-7人
合併症	肺炎、中耳炎、硬化性腦炎、死亡 孕婦感染可能導致流產或早產	細菌性感染、關節炎、呼吸道衰竭、腦炎/腦膜炎、死亡

致家長敬告書

為預防您的孩子感染麻疹，或萬一感染後能儘速就醫，並避免再傳染他人，煩請配合以下事項：

- 若您的孩子已滿一歲，請儘速進行麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）疫苗接種。
- 若您的孩子出現疑似麻疹症狀，如發燒、出疹，請配戴口罩，儘速就醫。
- 就醫時，請您不要搭乘大眾運輸工具，建議搭乘個人轎車、計程車，請全程配戴口罩，並開窗以維持空氣之流通。

民眾如何自我檢測

如果您發現您有以下症狀，極可能得到麻疹，

請立即就醫：

- 發燒（耳溫或肛溫） $\geq 38^{\circ}\text{C}$
- 出疹
- 至少具有咳嗽、流鼻水或結膜炎（畏光、流淚水或眼睛發紅）三種症狀中的一種

❖ 如有上述症狀，請戴上口罩，勿搭乘大眾運輸工具，以避免傳播他人。